

PŘÍLOHA K INFORMOVANÉMU SOUHLASU**502****IUI - nitroděložní inseminace****Vážená paní,**

chtěli bychom Vám poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

Účel, povaha a předpokládaný prospěch:

Cílem nitroděložní inseminace – IUI je zavedení spermií přímo do děložní dutiny s cílem dosažení Vašeho těhotenství.

Postup:

Nitroděložní inseminace je výkon, při kterém se do dutiny děložní zavádí laboratorně upravené spermie v malém množství speciálního roztoku v době dozrávání a uvolnění vajíčka. Inseminaci můžeme provést v cyklu, kdy vajíčko dozrává bez hormonální léčby, nebo při stimulaci. Stimulací vaječnicků se rozumí podávání tablet (většinou Clostilbegyt) nebo injekcí folikulostimulačního hormonu (FSH) podle rozpisu. Tyto přípravky vedou ke zvýšení aktivity vaječnicků a dozrávání vajíček. **Je třeba upozornit, že stimulace vaječnicků a inseminace významně zvyšují riziko vícečetného těhotenství!!!** Dávkování léků a kontrolní vyšetření jsou uvedeny v rozpisu léků.


Spermie do dutiny děložní zavádíme tenkou soupravou přes děložní čípek při zavedení poševních gynekologických zrcadel jako při gynekologickém vyšetření.

Možné komplikace:

Stimulace vaječnicků a nitroděložní inseminace jsou spojena s riziky, o kterých je nutné informovat.

Vícečetné těhotenství – patří k nejzávažnějším komplikacím. Při stimulaci vaječnicků může postupně dozrát větší počet vajíček, která se mohou oplodnit. Při velkém počtu vajíček doporučujeme odlehčovací punkci a ponechání maximálně 4 vajíček pro inseminaci. **Bez odlehčovací punkce inseminaci neprovádíme a nedoporučujeme pohlavní styk.**

Hyperstimulační syndrom – bouřlivá nadměrná reakce vaječnicků na stimulaci je provázená bolestmi v podbřišku, nevolností, volnou tekutinou v dutině břišní, v těžších případech poruchou vnitřního prostředí, poruchou srážlivosti krve, výpotkem na plicích. Neléčené těžké případy mohou být život ohrožující. Při odběru



vajíček může dojít k poranění orgánů dutiny břišní – např. střeva, cév, močového měchýře. Výkon může být komplikován také pánevní infekcí.

Další možné komplikace – např. bolesti v podbříšku, mohou vzniknout při zavedení spermií a kultivačního roztoku do dutiny děložní. Při nitroděložní inseminaci nelze zaručit dosažení těhotenství ani vyloučit vícečetné těhotenství!

Alternativa plánovaného výkonu:

Vyšší pravděpodobnost dosažení Vašeho těhotenství je při využití metod asistované reprodukce a podstoupení IVF cyklu.

Omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti:

Provedení nitroděložní inseminace nenese pro Vás žádné výrazné omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti. Doporučujeme pouze vyvarovat se přílišnému prohřívání se ve sprše nebo sauně. Pracovní neschopnost není nevyhnutelná.

Vážená paní,

naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se prosím svého ošetřujícího lékaře na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá.

- **Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod výkonu, způsob jeho provedení, a byla jsem seznámena s možnými komplikacemi. Souhlasím s navrhaným postupem.**
- **Byla jsem informována o výše uvedených skutečnostech, měla jsem možnost zeptat se a zvážit odpovědi, které jsem dostala. Chápu, že moje rozhodnutí je zcela dobrovolné. Svůj souhlas jsem si řádně rozmyslela, rozhodla jsem se svobodně a nepodepsala jsem ho v tísní.**
- **Žádáme o provedení intrauterinní inseminace.**

Pacientka

Jméno:

Rodné číslo:

Pojišťovna:

Podpis:

Datum:

Partner

Jméno:.....

Rodné číslo:

Pojišťovna:

Podpis:

Datum: